



Skala bólu dorošti







Instrukcja

Określenie stopnia nasilenia odczuwalnego bólu może być bardzo trudne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych w spektrum autyzmu. Nie wszyscy pacjenci będą w stanie skorzystać z przygotowanych skal i odpowiedzieć na pytanie: Jak silny ból odczuwasz? Jak bardzo Cię boli? Z powodu bardzo często występujących u osób w spektrum zaburzeń sensorycznych w ramach różnych zmysłów (nadwrażliwości oraz podwrażliwości sensorycznej) osoby te mogą w specyficzny, niekiedy nawet paradoksalny sposób odbierać wrażenia bólowe. U osób z nadwrażliwością mogą występować silne reakcje związane z bólem nawet przy najdrobniejszych urazach, zaś osoby z podwrażliwością sensoryczną i zaburzeniami czucia głębokiego mogą nie odczuwać bólu w sposób tak intensywny, jak wskazywałby na to stan ich urazu.

1. Przed planowaną wizytą zapytaj rodzica/opiekuna, czy pacjent rozumie kierowane do niego polecenia i pytania. Jeśli pacjent ma problem z rozumieniem mowy, dowiedz się, co jest pomocne w jej odczytywaniu (gesty, przedmioty, znaki graficzne itp.).
2. Jeśli osoba w spektrum autyzmu ma własne narzędzie do komunikowania się, np. książkę komunikacyjną, tablet lub komputer, zapytaj opiekuna/rodzica, czy pacjent jest w stanie zakomunikować nasilenie bólu oraz w jaki sposób to robi (czy podaje znak w odpowiedzi na pytanie lub wskazuje obrazki w swojej książce komunikacyjnej, na tablecie).
3. W czasie wizyty wykorzystaj skalę bólu, zadając pytania osobie w spektrum autyzmu: „Jak bardzo Cię boli? Następnie nazwij obrazki z poszczególnymi numerami od 1 do 10. Zapytaj wcześniej rodzica/opiekuna jakiej odpowiedzi możesz oczekiwać



Przód



Tyť

